

LA RONCE Mûre de jardin *Rubus fruticosus*



Les mûres de jardin disponibles après les fraises, les framboises et les groseilles sont très appréciées par les enfants qui, au retour de l'école, se précipitent vers le jardin pour une cueillette journalière et une consommation immédiate. Ces scènes de cueillette très animées réjouiront certainement papy et mamy ; nous leur conseillerons, dès lors, de prévoir un endroit bien dégagé et bien ensoleillé pour y installer des ronces.

La ronce cultivée est plus productive que la ronce sauvage mais ses fruits ont un goût moins prononcé. Elle n'a pas d'épines. Un pied de ronce peut produire pendant une quinzaine d'années.

Exigences

La ronce cultivée supporte une grande diversité de sols, même humides, à condition qu'ils ne soient pas calcaires et aime les climats tempérés ; elle redoute les étés chauds et secs et les hivers rigoureux. Dans nos régions d'Europe occidentale, il ne faut pas la cultiver au-dessus de 900 m d'altitude. Si l'été se révèle trop sec, des arrosages réguliers sont conseillés.

Plantation

Cette plante sarmenteuse doit obligatoirement être palissée sur un mur ou entre des poteaux sur une hauteur de deux mètres. Les fils de soutien généralement au nombre de cinq sont espacés de 30 cm. Etant donné la grande vigueur des sarments qui atteignent 3 à 5 mètres de longueur, les plants seront distants de 2 mètres au moins.

Taille

Il ne faut pas tailler la première année de formation.

Les années suivantes, des interventions sont nécessaires. Au cours de l'été, on conserve 5 jeunes pousses partant du pied et on les attache horizontalement sur les fils. Elles produiront l'année suivante sur leurs rameaux latéraux.

En hiver, on coupe à la base les branches ayant produit des fruits l'été précédent.




Fig. 1 – Palissade sur cinq fils distants de 30 cm. Attachez les tiges sur un côté du pied (1). Attachez les nouvelles pousses de l'année, celles qui produiront des fruits l'année suivante, sur l'autre côté du pied (2). Après la récolte, coupez au niveau du sol les tiges ayant porté des fruits (3). On conservera chaque année cinq tiges.

Récolte



Cette récolte très échelonnée débute au mois d'août. Des passages journaliers sont nécessaires afin de prélever des fruits à la maturité souhaitée.

On peut récolter jusqu'à 10 kg de baies par plant, moins l'année de la plantation.

Multiplication

Les longs sarments se prêtent au marcottage.

Variétés

On peut citer plusieurs variétés sans épines : Youngberry (gros fruits), Black Satin (gros fruits acides), Dirksen (plante rustique), Oregon Evergreen, Thornfree (fruits sucrés et parfumés), Thornless Evergreen (feuillage très décoratif).

Il existe des hybrides de ronce et de framboisier (Loganberry, Tayberry) qui se cultivent comme la ronce. Les fruits de faible qualité gustative sont utilisés en confiture.